




Cedrus libani subsp. atlantica



Höjd	20 - 25 (40) m
Bredd	10-15m
Krona	broad pyramidal, half-open crown, capricious growing
Bark och grenar	dark greyish black bark, scaly, twigs have downy hair
blad	needles, light green to silvery blue, 2 - 2.5 cm, evergreen
Blommor	unremarkable, fragrant flowers
Frukter	barrel-shaped cones, 5 - 7 cm long, turning from green to brown
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	all, provided well-permeable and not too moist
Markfuktighet	Möjlig på torr mark
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot vind
Tillämpning	industriområde
Form	högstam träd, högstam barrträd, solitärt barrträd
Ursprung	Atlas mountains (north-eastern Algeria and northern Morocco)
Synonymer	Cedrus atlantica

Denna geografiska underart av Cedrus libani är ett snabbväxande stort träd med horisontella grenar i senare delen av livet. Växer naturligt på torra, kalkhaltiga bergssluttningar i Atlasbergen i nordvästra Afrika. Stammen är fortfarande grå och slät i början men blir grövre på gamla träd. Senare lossnar den i små plattor och släpper den rödbruna barken. Förgreningen är ganska lös och öppen och kvistarna är till en början fortfarande grågröna till gråbruna men blir grå under det andra året. Barren sitter i buntar om 20 - 40 tillsammans och är 2 - 2,5 cm långa. De upprättstående kottarna dyker upp på hösten. Unga kottar är gröna men blir senare lila-bruna till bruna. Denna ceder kräver mycket sol och tål luftföroreningar bra.