




Taxus cuspidata



Höjd	2.5 - 5 m
Bredd	3-5m
Krona	spherical, irregular, later broader, dark, dense crown
Bark och grenar	reddish brown, flaking bark, twigs green
blad	needles, deep dark green, 1.5 - 3 cm, evergreen
Blommor	unremarkable, dioecious, ♂ yellow buds, ♀ green
Fruktar	brownish black seeds, covered 4/5 with a fleshy, red case
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	har giftiga beståndsdelar
Marktyp	sandy, loamy soil, well-permeable
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, födoträd för fåglar
Tillämpning	trädlådor, takträdgårdar, industriområde, liten trädgård, patios
Form	solitärt barrträd
Ursprung	Eastern Asia

En långsamväxande, tätt grenad buske som kan växa till ett flerstamigt, oregelbundet träd. I sitt naturliga utbredningsområde blir den 15 - 20 m hög men i odling blir den inte högre än ca 5 m. Stammen är rödbrun och flagnande. Grenarna växer spridda och något upprätt och är tätt täckta av korta sidogrenar. De mycket mörkgröna barren är linjeformade och spetsiga. De är ljusare gröna på undersidan och den korta stjälken är gulaktig. Den oansenliga blomningen följs av frön, varav 4/5 är omgivna av ett köttigt rött hölje som är ca 0,5 cm långt. På grund av sin bättre härdighet än *T. baccata* odlas denna art i stor utsträckning i USA och Kanada. I Europa används *T. cuspidata* mest för beskärning (bonsai) på grund av sin flerstammiga tillväxt.