



Acer xfreemanii 'Armstrong'



Höjd	10 -15 m
Bredd	4-6m
Krona	columnar, dark, dense crown
Bark och grenar	no particulars
blad	3/5 lobes, green, 10 -20 cm
Höstfärg	orange, röd
Blommor	flower corymbs, red, March/April
Frukter	none, fruitless cultivar
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	not too limy
Platskrav	Tål härdning
vinterhärdighet	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Vindbeständighet	very good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, värdträd för fjärilar
Tillämpning	alléer och breda vägar, smala gator
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Scanlon Nurseries, Ohio, USA, 1951
Synonymer	Acer rubrum 'Armstrong'

Acer xfreemanii 'Armstrong' cultivar uppstod i USA 1951 och räknades fram till nyligen som A. rubrum. Nya studier har visat att "Armstrong" härstammar från en korsning mellan A. rubrum och A. saccharinum och därför tillhör hybriden Acer x freemanii. Denna hybrid har inte bara uppkommit genom mänsklig aktivitet, utan förekommer också i naturen i USA. Bladen är tre- till femflikiga och gröna. Undersidan är grågrön. I vårt land kan den vackra orangeröda höstfärgen endast ses efter varma somrar. Är bredrotad med fin förgrening. 'Armstrong' kräver en jord som inte är alltför kalkhaltig. Trädet klarar sig bra i stenläggning, vilket gör det idealiskt för användning på smala gator och alléer.