



Acer cappadocicum 'Rubrum'



Höjd	10 - 15 m
Bredd	6-9m
Krona	flattened, round, wide crown, half-open crown
Bark och grenar	young twigs dark purple at first, later dark green
blad	5/7 lobes, pointed, unfurling deep purple
Höstfärg	gul
Blommor	yellow-green corymbs, 6 - 7 cm, May
Frukter	winged
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	humic, not too dry
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, värdträd för fjärilar
Tillämpning	alléer och breda vägar
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Baumschulen Booth, Germany, 1838

Acer cappadocicum 'Rubrum' liknar i alla delar och egenskaper den tidigare beskrivna 'Aureum'. Den enda skillnaden är bladfärgen. De unga bladen på "Rubrum" är djupt purpurröda och övergår till mörkt rödgrönt under sommaren. På hösten blir bladen djupt gula. Till skillnad från den gulbladiga 'Aureum' är 'Rubrum' inte benägen att bränna bladen under soliga perioder på sommaren. 'Rubrum' är ett utmärkt gatu- och parkträd, men tål stenläggning mindre bra än den gulbladiga 'Aureum'.