



Acer davidii



Höjd	8 - 12 (15) m
Bredd	7-11m
Krona	oval to round, light, open crown, capricious growing
Bark och grenar	twigs purple with greyish white longitudinal stripes
blad	oval to elongated, dark green, 8 - 16 cm
Höstfärg	gul, orange, röd
Blommor	pendent corymb-shaped racemes, light yellow, May
Fruktar	single-seeded, single-winged, light green
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	all soils
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, värdträd för fjärilar
Tillämpning	trädlådor, takträdgårdar
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Central China

Med sin iögonfallande randiga bark tillhör Acer davidii, liksom A. capillipes och A. rufrinerve, de s.k. "ormskinnslönnarna". De unga kvistarna är mörkt purpurroda och behåller denna färg även på vintern. De äldre kvistarna och stammen har de karakteristiska gråvita längsgående ränderna. Bladen är mindre tydligt flikiga och, till skillnad från A. capillipes, håriga på undersidan längs venerna. Hos unga plantor är bladet treflikigt, hos gamla(re) träd oflikigt. Blommorna är enkönade, dvs. han- och honblommor förekommer på samma planta. Växten har ett starkt förgrenat och kompakt rotsystem. Eftersom växten är mindre lämplig för plantering i stenläggning är dess användning begränsad till plantering som solitär i parker och större trädgårdar. Detta prydnadsträd gör sig också bra i grönbälten.