



Acer tataricum subsp. ginnala



Höjd	5 - 7 (10) m
Bredd	5-7m
Krona	fan-shaped, half-open crown
Bark och grenar	trunk grey, slightly grooved: young twigs red-brown
blad	3-lobed, bright green, 4 - 8 cm
Höstfärg	orange, röd
Blommor	cream-white, terminal corymbs, May/June
Frukter	winged, almost parallel, circa 2.5 cm long
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	any soil
Markfuktighet	Möjlig på torr mark
Platskrav	Tål halvhärdning
vinterhärdighet	3 (-40,0 do -24,5 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, beständig mot vägsalt
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, beständig mot vägsalt, nektar- och pollenträd för bin
Tillämpning	trädlådor, industriområde
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Central and North China, Japan, Manchuria
Synonymer	Acer ginnala

Acer tataricum subsp. ginnala växer vanligtvis upp till ett litet, flerstamigt träd. Dess spridda grenverk skapar så småningom ett fint solitärt träd. Trots sin ganska långsamma tillväxt kan denna lönn ändå nå en höjd och bredd på över 10 m när den är fullvuxen. I dess naturliga växtområden i Asien och Ryssland förekommer ännu större exemplar. Unga och smala kvistar som får tillräckligt med solljus blir rödbruna. Äldre grenar har en grå färg. På de treflikiga bladen är mittfliken smal och lång. Ett viktigt prydnadsvärde är höstfärgningen av de glänsande mörkgröna bladen i många nyanser av rött till orange. I ett soligt läge ser det ofta bättre ut. Fin rottillväxt är platt grund. En mycket härdig växt som står emot luftföroreningar, torka och vägsalt väl.