



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Höjd	15 - 20 m
Bredd	8-12m
Krona	wide ovoid to round, half-open crown
Bark och grenar	at a mature age deeply furrowed
blad	odd-pinnate, 9 - 13 leaflets, deep green, 15 - 25 cm, feathered leaf
Höstfärg	orange, röd, lila
Blommor	inconspicuous yellow green, in small panicles, April
Frukter	none, fruitless cultivar
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	not too rich in connection with growth rate
Markfuktighet	Möjlig på torr mark, Möjlig på våt mark
Platskrav	Tål härdning
vinterhärdighet	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Vindbeständighet	poor in the case of a rapid growth
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vägsalt
Tillämpning	alléer och breda vägar
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Australia, 1920
Synonymer	Fraxinus a. 'Flame', Fraxinus a. wollastonii

Friskt men inte starkväxande urval med något oregelbunden kronform. F. angustifolia 'Flame' och 'Wollastonii' är identiska med 'Raywood' och kan därför betraktas som synonymer. Huvudgrenen växer rakt och stamgrenarna är lutande. Barken är grå och djupt räfflad och kvistarna blir senare i livet från olivgröna till grågröna. 'Raywood' har en sluten krona som ungt träd, äldre träd blir halvöppna. De glansiga, djupgröna bladen består av 9 - 13 smala småblad. Dessa är ca 5 - 10 cm långa. På hösten blir bladen orangegula till djupt purpurröda. På varmare mark och under en varm höst är höstfärgen mer intensiv. Efter den oansenliga blomningen sker ingen fruktsättning. På bördiga jordar är tillväxten ofta snabbare än på fattiga jordar. Grenbrott kan då bli följden.