



Quercus robur 'Timuki'



Höjd	15 - 20 m
Bredd	8-12m
Krona	round, half-open crown
Bark och grenar	twigs dark brown, bark dark grey, deeply grooved
blad	obovate, lobed, dark greenish purple, 7 - 14 cm
Blommor	green-yellow ♂ catkins, 2 - 4 cm, May
Frukter	ovate to oval, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 - 6, cupule with triangular contiguous scales
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	fertile and moist
Markfuktighet	Möjlig på våt mark
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, beständig mot vägsalt
Tillämpning	industriområde
Form	högstam träd
Ursprung	Raimond Cinovskis, Riga, Latvia, 1946

Rödbladig sort av *Q. robur* med brett äggformad till slutligen rund krona. Växer betydligt bättre än den gamla purpurbladiga sorten 'Purpurascens'. Bark, blomning och frukter liknar artens. De omvänt äggrunda bladen har också samma form som hos arten, men är större än hos 'Purpurascens'. Bladen är gröna i utspringet men blir successivt mörkare för att slutligen bli glänsande mörkgrön-lila på sensommaren via röda. Trädet hittades av M. Timuki 1939, men namngavs och distribuerades inte förrän 1946. God tillväxt och vackra bladfärger är de främsta kännetecknen för denna purpurbladiga ek. Dessutom är 'Timuki' betydligt mindre mottaglig för mjöldagg.