



Styrax obassia



Höjd	10 - 15 m
Bredd	5-8m
Krona	broad ovoid to round, half-open crown, capricious growing
Bark och grenar	twigs reddish brown, bark grey, smooth
blad	broad oval to round, dark green, 5 - 20 cm
Blommor	in racemes, 10 - 20 cm, white with yellow stamens, approx. 2 cm, June, fragrant flowers
Frukter	ovoid drupe, white to yellowish, hairy
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	light loamy and humic soil
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	6b (-20,5 do -17,8 °C)
Vindbeständighet	moderate
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6)
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), födoträd för fåglar
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Japan, Korea, Northern China

Mycket stor buske eller medelstort till stort träd med bred äggformad till rund krona. De unga kvistarna är rödbruna, till en början håriga, senare mörkt purpurfärgade och kala till lätt flagnande. Barken på äldre träd är grå och slät. De stora bladen är nästan runda med en iögonfallande spetsig spets. De är mörkgröna. De två nedersta bladen på varje skott sitter nästan mitt emot varandra. De återstående bladen sitter utspridda längs kvisten. Bladbasen på bladen är breddad, konkav och omsluter knoppen. Blommorna öppnar sig i juni och hänger i långa klasar. De enskilda blommorna är ca 2 cm stora och vita med gula ståndare. De har en mycket stark och behaglig doft. Trädet blommar vanligtvis mycket rikligt och är då starkt gynnat av bin. Blommorna följs av hårda, äggformade, vita till gulaktigt håriga droppar med mörkgrön kalyx.