





Ostrya carpinifolia 'F.C. Moree'



Höjd	12 - 15 m
Bredd	8-15m
Krona	regular branches, pyramidal crown
Bark och grenar	brown-grey, grooved, branches olive green
blad	ovoid to oval, green, double serrated leaf edge, 5 - 10 cm
Höstfärg	gul
Blommor	yellow-green catkins, ? about 4 - 6 cm, ? catkins shorter, April
Frukter	nutlets, in fruit resembling hops
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	likes calcareous soil
Markfuktighet	Möjlig på torr mark
Platskrav	Tål härdning
vinterhärdighet	5b (-26,0 do -23,4 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Tillämpning	alléer och breda vägar
Form	högstam träd
Ursprung	U.S. National Arboretum, Washington D.C., USA, 1999

'F.C. Moree' är en sort av humleboken *Ostrya carpinifolia*. Ytligt sett liknar *O. carpinifolia* *Carpinus betulus*, avenboken, men skiljer sig från den genom sina distinkta frukter, som liknar humlekottar. 'F.C. Moree' har en regelbundet förgrenad, pyramidal krona och blir 12-15 m hög. Den brungrå barken är under lång tid slät, men senare lätt räfflad och med oregelbundna ljusgrå fläckar. Bladen är som hos arten *O. carpinifolia*; äggformade till ovala och 5-10 cm långa. På hösten blir de gula. I april blommar trädet med hängande kissar, som följs av de slående frukterna, som liknar humlekottar.

_x000D 'F.C. Moree' är ett lättodlat träd med få krav på jordmånen. Trädet har valts ut av Bart van de Sluis från Randwijk och fått sitt namn efter Frans Moree, dåvarande ordförande i plantskoleföreningen Kring Opheusden.

Härdighetszon 5b .