




Betula costata



Höjd	12 – 25 (30) m
Bredd	10-15m
Krona	broad ovoid to round, half-open crown
Bark och grenar	light grey-brown to greyish yellow, flaking
blad	ovoid to narrow ovoid, green, 5 - 10 cm
Blommor	catkins, ♀ single and erect, ♂ 4 - 6 cm, April
Frukter	ovoid fruiting catkins, 2 - 3 cm
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	few soil requirements, not drought-tolerant
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Vindbeständighet	moderate
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6)
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), värdträd för fjärilar
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Eastern and central China, Korea, Manchuria

Stort träd med en bred äggformad till rund, halvöppen krona. Kräver mycket utrymme på grund av sin breda och relativt låga förgrening. Har vackert flagnande grenar och bark. Ska inte förväxlas med olika typer av *B. ermanii*, särskilt 'Blush', som fortfarande odlas som *B. costata*. Några skillnader är att barken på *B. costata* börjar flagna redan andra eller tredje året, medan detta inte börjar förrän senare i livet hos *B. ermanii*. Årskvisten hos *B. costata* är grov medan den hos *B. ermanii* är slät. Slutligen är bladen hos *B. costata* mer än dubbelt så långa som breda och har en rak bladbas. Hos *B. ermanii* är bladet kortare och har en något hjärtformad bladbas. Tål torka dåligt och är känslig för (sjö)vind.