



Koelreuteria paniculata

'September'



Höjd	7 - 17 m
Bredd	7-15m
Krona	broad, almost round, somewhat irregular, light, open crown
Bark och grenar	grey-brown, slightly grooved
blad	(doubly) pinnate, dull green, 30 - 35 cm, feathered leaf
Höstfärg	gul, orange
Blommor	yellow, in large terminal plumes, August/September
Frukter	bladder-shaped, bronze in colour, seeds black, Ø approx. 4.5 cm
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	makes very few demands on the soil, stands up to dry conditions
Markfuktighet	Möjlig på torr mark
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	6b (-20,5 do -17,8 °C)
Vindbeständighet	moderate
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6)
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), värdträd för fjärilar
Tillämpning	trädlådor
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Indiana University, Bloomington, USA, 1960

Detta amerikanska urval växer initialt snabbare än arten. Den runda kronan blir bredare och bredare. Bredspridda grenar böjer sig. Det stora, flikiga (ibland dubbelflikiga) bladet består av 7 - 15 bladsegment. Dessa är flikiga, ca 7 - 10 cm långa och har en tandad bladkant. Bladen är bronsfärgade på våren och gula till orangefärgade på hösten. De många små, gula blommorna sitter i ändställda, lösa klasar på ca 30 cm. Blomningen börjar 6 till 8 veckor senare än hos arten och är ofta mycket rik. De ca 4,5 cm stora blå frukterna övergår från grönt till bronsfärgat och innehåller några svarta frön. De sitter kvar på trädet under lång tid. Föredrar ett skyddat läge eftersom unga träd kan skadas av frost, men återhämtar sig annars bra.