



Ostrya virginiana



Höjd	8 - 20 m
Bredd	8-15m
Krona	round, dark, dense crown
Bark och grenar	bark grey-brown, grooved, young twigs bear hairs
blad	elongated ovoid to oval, green, 6 - 12 cm
Höstfärg	gul
Blommor	yellowish-green catkins, ♂4-5 cm long, ♀2 - 2.5 cm long, April
Fruktar	nutlets, in fruit resembling hops
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	likes calcareous soil
Markfuktighet	Möjlig på torr mark
Platskrav	Tål härdning
vinterhärdighet	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	central and eastern part of the United States

Inhemsk i stora delar av Nordamerika där den är en populär producent av lövträ ('ironwood'). Den mycket låga förgreningen är slående: stammen är ofta inte mer än en halv meter hög. De hängande sidogrenarna bildar så småningom en kolossal krona. Den korta stammen är brungrå, räfflad och avskalad i smala små plattor. Hos äldre träd blir den allt mörkare. Unga kvistar är håriga, senare kala. De långa ovoida till ovala bladen har en dubbelt tandad bladkant och blir påfallande gula på hösten. Bladbasen är mer hjärtformad än hos *O. carpinifolia*. Blomning med 4 - 5 cm långa, gulgröna hanblommor och honblommor i små ax. Dessa utvecklas till frukter som är formade som humlekottar och är ca 6 cm långa.